

О ГЛУБИНЕ ФУНКЦИЙ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ В НЕКОТОРЫХ БАЗИСАХ

ЛОЖКИН С. А.

Московский Государственный Университет
Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики
Кафедра Математической кибернетики, Москва, Ленинские горы

(Поступило 29. 12. 1982)

В настоящей работе продолжается изучение одного из основных классов управляющих систем — класса схем из функциональных элементов (с.ф.э.). Для каждой с.ф.э. определяется ее естественная временная характеристика, называемая глубиной*, и рассматриваются вопросы оптимальной (по глубине) реализации функций алгебры логики (ф.а.л.) с.ф.э. в некоторых базисах.

Пусть $\Sigma = \{E_1, E_2, \dots, E_r\}$ — система исходных элементов (базис) и для $i = 1, 2, \dots, r$ $E_i = (\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_{k_i}), D_i)$, то есть элемент E_i реализует ф.а.л. φ_i , существенно зависящую от всех своих k_i аргументов, и имеет глубину $D_i \geq 0$ (D_i может быть, вообще говоря, произвольным отрицательным действительным числом).

Будем предполагать, что система $\{\varphi_i\}_{i=1}^r$ базисных ф.а.л. полна и что с.ф.э. над базисом Σ строятся в соответствии с обычными правилами (см., например, [9]).

Под глубиной цепи, состоящей из последовательно соединенных элементов базиса, будем понимать сумму глубин всех ее элементов; глубину с.ф.э. будем определять как максимальную глубину ее цепей, а глубину ф.а.э. f в базисе Σ — как минимальную глубину с.ф.э. над базисом Σ , реализующих f .

Из [3, 8] следует, что тип асимптотического поведения функции Шеннона $D_\Sigma(n)$, которая равна максимальной глубине ф.а.л. от n переменных в базисе Σ , определяется множеством Z , состоящим из тех базисных ф.а.л. φ_i , $i = 1, 2, \dots, r$, для которых $D_i = 0$, а именно:

1. $D_\Sigma(n) \sim \tau_\Sigma \cdot n$, если Z состоит из ф.а.л. одной переменной;
2. $D_\Sigma(n) \sim \alpha_\Sigma \log_2 n$, если Z состоит из линейных ф.а.л.;

* В работах разных авторов эта временная характеристика называлась либо задержкой (см., например, [3, 4, 8]), либо глубиной (см., например, [1, 11, 12]). Однако, учитывая результаты [10], следует признать, что термин глубина является более удачным.

3. $D_Z(n) = C'_Z$ при $n \geq n_Z$, если Z содержит нелинейную ф.а.л., где $\tau_Z, \alpha_Z, C'_Z, n_Z$ — некоторые константы, зависящие от базиса. Формулы, выражающие τ_Z, α_Z, C'_Z через характеристики элементов базиса, получены в [3, 4, 8].

Для первых двух типов асимптотического поведения функции Шеннона $D_Z(n)$ естественно возникает задача об оценке остаточных членов соответствующих асимптотических формул. Из [3] следует, что в случае второго типа асимптотического поведения функции Шеннона $D_Z(n)$ справедливо равенство:

$$D_Z(n) = \alpha_Z \cdot \log_2 n + O(1).$$

В работах [1, 11, 12] были получены некоторые оценки остаточного члена асимптотической формулы первого типа для функции Шеннона $D_{\Sigma_0}(n)$ в базисе

$$\Sigma_0 = \{(x \cdot y, 1), (x \vee y, 1), (\bar{x}, 1)\}.$$

Наиболее точные из этих оценок были получены в [1], где было доказано, что

$$(1) \quad]n - \log_2 \log_2 n + O(1)[\leq D_{\Sigma_0}(n) \leq]n - \log_2 \log_2 n + O(1)[+ 2$$

(через $]a[$ будем обозначать ближайшее к a сверху целое число, а через $[a]$ — ближайшее к a снизу целое число).

Настоящая работа продолжает исследования в данном направлении. Для некоторых конкретных базисов Σ первого типа с целочисленными положительными величинами $D_i, i = 1, 2, \dots, r$ и $\tau_\Sigma = 1$ (в частности и для базиса Σ_0) поведение функции Шеннона $D_\Sigma(n)$ устанавливается здесь, вообще говоря, с точностью до $O(1)$, то есть для $D_\Sigma(n)$ доказывается равенство вида:

$$(2) \quad D_\Sigma(n) =]n - \log_2 \log_2 n + O(1)[+ C''_\Sigma,$$

где C''_Σ — некоторая константа, зависящая от базиса.

Формулировки полученных результатов были опубликованы в [5].

§ 1. Основные определения, обозначения и некоторые вспомогательные результаты

Введем необходимые определения и обозначения, касающиеся ф.а.л. и их реализации в классе с.ф.э.

Пусть $B = \{0, 1\}$ и $B^n = \underbrace{B \times B \times \dots \times B}_n$, где $n = 1, 2, \dots$, — единственный n — мерный куб, то есть множество наборов из 0 и 1 длины n .

Множество ф.а.л. $f: B^m \xrightarrow{f} B$ от m переменных будем обозначать через P_2^m , а множество всех ф.а.л. — через P_2 . Будем считать, что переменные берутся из некоторого фиксированного счетного алфавита $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$.

Наборы $(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$, где $\sigma_i \in B$, $i = 1, 2, \dots, n$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где $x_i \in X$, $i = 1, 2, \dots, n$, $(f_1, f_2, \dots, f_n)$, где $f_i \in P_2$ и т.п. будем обозначать также через $\tilde{\sigma}^n$ (или $\tilde{\sigma}$), $\tilde{x}^n$ (или $\tilde{x}$), $\tilde{f}^n$ (или $\tilde{f}$) и т.п.

Для ф.а.л. $f(\tilde{x}^n)$ через N_f будем обозначать множество тех наборов $\tilde{\beta} \in B^n$, для которых $f(\tilde{\beta}) = 1$.

Для наборов $\tilde{\sigma}, \tilde{\gamma} \in B^n$ через $\tilde{\sigma} \cdot \tilde{\gamma}$, $\tilde{\sigma} \vee \tilde{\gamma}$ и $\tilde{\sigma} + \tilde{\gamma}$ будем обозначать наборы, получающиеся поразрядной операцией конъюнкции, дизъюнкции и сложения по модулю 2 соответственно из наборов $\tilde{\sigma}, \tilde{\gamma}$. Число единиц в наборе $\tilde{\sigma}$ будем обозначать через $\|\tilde{\sigma}\|$.

Единичной сферой в B^n с центром в $\tilde{\beta} \in B^n$ будем, как обычно, называть множество всех таких наборов $\tilde{\gamma} \in B^n$, для которых $\|\tilde{\beta} + \tilde{\gamma}\| = 1$. Как известно (см., например, [6]), для числа n , являющегося степенью 2, B^n можно разбить на непересекающиеся единичные сферы.

Через $I_{\tilde{\gamma}, \tilde{e}}(\tilde{x})$ и $K_{\tilde{\gamma}, \tilde{e}}(\tilde{x})$, где $\tilde{\gamma} = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$, $\tilde{e} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, $\tilde{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\tilde{\gamma}, \tilde{e} \in B^n$ будем обозначать следующие ф.а.л., называемые элементарной дизъюнкцией и элементарной конъюнкцией (э.к. ранга $\|\tilde{\gamma}\|$ от переменных $\tilde{x}$

$$I_{\tilde{\gamma}, \tilde{e}}(\tilde{x}) = \bigvee_{\gamma_i=1} x_i^{e_i}, \quad K_{\tilde{\gamma}, \tilde{e}}(\tilde{x}) = \bigwedge_{\gamma_i=1} x_i^{e_i},$$

где, как обычно, $x^0 = \bar{x}$, $x^1 = x$. Положим также, что

$$I_{\tilde{e}}(\tilde{x}) = I_{\tilde{1}, \tilde{e}}(\tilde{x}) \quad \text{и} \quad K_{\tilde{e}}(\tilde{x}) = K_{\tilde{1}, \tilde{e}}(\tilde{x}), \quad \text{где} \quad \tilde{1} = (1, 1, \dots, 1) \in B^n.$$

Э.к. K от переменных $\tilde{x}$ называется допустимой для ф.а.л. $f(\tilde{x})$, если $N_K \subseteq N_f$.

С.ф.э. над базисом $\sum = \{E_1, E_2, \dots, E_r\}$, где $E_i = (\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_{k_i}), D_i)$, $i = 1, 2, \dots, r$, будем задавать ациклическими ориентированными графами, вершины и ребра которых помечены следующим образом:

1. если число ребер, входящих в вершину w , которое мы будем обозначать через $\text{indeg}(w)$, равно 0, то вершина w называется входом схемы и помечается символом некоторой переменной из X , причем разные входы помечаются разными переменными;

2. если $\text{indeg}(w) > 0$, то вершина w называется внутренней вершиной схемы и помечается символом некоторого элемента $E_i \in \sum$ такого, что $\text{indeg}(w) = k_i$;

3. все ребра, входящие во внутреннюю вершину w помечаются числами $1, 2, \dots, \text{indeg}(w)$.

Через $V_{\text{вх}}(S)$, $V_{\text{вн}}(S)$, $V(S)$ и $U(S)$ будем обозначать множество входов, множество внутренних вершин, множество всех вершин и множество ребер с.ф.э. S соответственно.

В каждой вершине w с.ф.э. S над базисом $\sum$ реализуется некоторая ф.а.л. f_w , зависящая от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, приписанных входам S , и определяемая по индукции следующим образом:

1. если $w \in V_{\text{вх}}(S)$, то f_w совпадает с переменной, приписанной w ;
2. если $w \in V_{\text{вн}}(S)$ помечена символом элемента $E_i \in \sum$, для $j = 1, 2, \dots, k_i$ ориентированная пара $(w_j, w) \in U(S)$ помечена числом j , в вершине w_j , $j = 1, 2, \dots, k_i$ реализуется ф.а.л. $f_j = f_w$, то в вершине w реализуется ф.а.л.

$$f_w = \varphi_i(f_1, f_2, \dots, f_{k_i}).$$

Число ребер, выходящих из вершины w , будем обозначать через $\text{outdeg}(w)$. Вершины w , для которых $\text{outdeg}(w) = 0$, будем называть выходами схемы. С.ф.э. S над базисом $\sum$ будем называть формулой (ф.), если для любой вершины $w \in V_{\text{вн}}(S)$ $\text{outdeg}(w) \leq 1$, и абсолютной формулой (а.ф.), если для любой вершины $w \in V(S)$ $\text{outdeg}(w) \leq 1$.

Будем считать, что рассматриваемые формулы имеют только один выход, и будем говорить, что с.ф.э. S реализует ф.а.л. f , если f реализуется на выходе S . С.ф.э. S' и S'' будем называть эквивалентными, если они реализуют одну и ту же ф.а.л.

Изоморфизм с.ф.э. над базисом $\sum$ будем понимать как изоморфизм соответствующих помеченных графов. С.ф.э. S' и S'' будем называть квазиизоморфными, если путем переименования (без отождествления) входов, их можно сделать изоморфными.

Цепью в с.ф.э. S будем называть последовательность ее внутренних вершин $w_1, w_2, \dots, w_l$, для которой $(w_{i-1}, w_i) \in U(S)$ при всех $i = 2, 3, \dots, l$. Глубиной такой цепи будем называть число $D_{i_1} + D_{i_2} + \dots + D_{i_l}$, где i_j , $j = 1, 2, \dots, l$, — номер элемента, приписанного вершине w_j , а глубиной с.ф.э. S над базисом $\sum$ — максимальную глубину ее цепей, которую мы будем обозначать через $D(S)$.

Однородной полной μ -ярусной а.ф., построенной из элементов E_i , будем называть а.ф. F , для которой $|V_{\text{вх}}(F)| = (k_i)^\mu$, $D(F) = \mu D_i$ и все внутренние вершины F помечены символами E_i (все такие а.ф. будут, очевидно, квазиизоморфными).

В предположении полноты системы $\{\varphi_i\}_{i=1}^r$ базисных ф.а.л. в P_2 введем, как обычно, функцию Шеннона $D_\Sigma(n)$:

$D_\Sigma(f) = \min D(S)$, где $f \in P_2$ и минимум берется по всем с.ф.э. S над базисом $\sum$, реализующим ф.а.л. f .

Очевидно, что для любой с.ф.э. S над базисом $\sum$ существует эквивалентная ей ф. F над $\sum$, для которой $D(F) = D(S)$. Следовательно, при определении и изучении функций $D_\Sigma(f)$ и $D_\Sigma(n)$ можно ограничиться рассмотрением класса формул над базисом $\sum$.

Нижние оценки в (2) будут получены с помощью обычных мощностных соображений, проводимых, возможно, с учетом функциональных особенностей некоторых из рассматриваемых базисов. Получение нижней оценки для функции Шеннона $D_\Sigma(n)$ в случае произвольного базиса первого типа $\sum = \{E_1, E_2, \dots, E_r\}$, $E_i = (\varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_{k_i}), D_i)$, $i = 1, 2, \dots, r$ можно осуществить, например, следующим образом (ср. [8]).

Лемма 1. Для любой с.ф.э. S над базисом Σ

$$(3) \quad |V_{\text{вх}}(S)| \leq 2^{\frac{D(S)}{\tau_\Sigma}}, \quad \text{где} \quad \tau_\Sigma = \min_{k_i \geq 2} \frac{D_i}{\log_2 k_i}. \quad \square$$

Доказательство проводится индукцией по числу вершин.

Обозначим через $\mathfrak{N}_\Sigma(D)$, $D \geq 0$, — множество попарно не квази-изоморфных а.ф. F над базисом Σ таких, что $D(F) \leq D$ и в F отсутствуют цепи, состоящие из двух вершин w', w'' , для которых $\text{indeg}(w') = \text{indeg}(w'') = 1$. Обозначим через $\mathfrak{M}_\Sigma(D, n)$, $D \geq 0$, $n = 1, 2, \dots$, — множество ф. F' над базисом Σ таких, что $|V_{\text{вх}}(F')| \leq n$ и F' получается из некоторой а.ф. $F \in \mathfrak{N}_\Sigma(D)$ отождествлением входов и приписыванием каждому из них переменной из множества $x_1, x_2, \dots, x_n$. Очевидно, что для любой ф. F'' над базисом Σ такой, что $D(F'') \leq D$, $|V_{\text{вх}}(F'')| \leq n$ и каждый вход F'' помечен некоторой переменной $x_1, x_2, \dots, x_n$, найдется эквивалентная ей формула из $\mathfrak{M}_\Sigma(D, n)$.

Лемма 2. Для некоторой константы $C_{1,\Sigma}$, зависящей от базиса Σ ,

$$(4) \quad |\mathfrak{N}_\Sigma(D)| \leq (D_{1,\Sigma})^{2^{D/\tau_\Sigma}}. \quad \square$$

Доказательство. По построению множества $\mathfrak{N}_\Sigma(D)$ для любой а.ф. $F \in \mathfrak{N}_\Sigma(D)$ справедливо

$$(5) \quad |U(F)| \leq 4 |V_{\text{вх}}(F)|.$$

Граф, соответствующий а.ф. F , является, очевидно, корневым деревом (определение корневого дерева см., например, в [2]), и для любой а.ф. F путем нанесения определенным образом пометок на внутренние вершины и ребра некоторого корневого дерева можно всегда получить а.ф. F' квазиизоморфную F (нанесение пометок на входы для квазиизоморфизма несущественно). Поскольку число попарно неизоморфных корневых деревьев с h ребрами не превосходит 4^h (см., например, [2] стр. 189), то, учитывая (3), (5) и то, что для любой с.ф.э. S $|V_{\text{вх}}(S)| \leq |U(S)|$, можно получить оценку (4), где

$$C_{1,\Sigma} = \left(8r \cdot \left(\max_{1 \leq i \leq r} k_i \right) \right)^4.$$

Лемма доказана. $\square$

В силу (3)–(4) для множества $\mathfrak{M}_\Sigma(D, n)$ будет, очевидно, справедливо неравенство

$$(6) \quad |\mathfrak{M}_\Sigma(D, n)| \leq (n \cdot C_{1,\Sigma})^{2^{D/\tau_\Sigma}}.$$

Лемма 3. Для почти всех ф.а.л. $f \in P_2^n$

$$D_\Sigma(f) \cong D_n,$$

где

$$(7) \quad D_n = \tau_\Sigma (n - \log_2 \log_2 (n \cdot 2C_{1,\Sigma})). \quad \square$$

Доказательство. Рассмотрим множество Q^n , состоящее из тех ф.а.л. $f \in P_2^n$, для которых $D_{\mathcal{E}}(f) < D_n$. Любую ф.а.л. $f \in Q^n$ можно реализовать некоторой ф. $F \in \mathfrak{M}_{\mathcal{E}}(D_n, n)$ и поэтому

$$(8) \quad |Q^n| \leq |\mathfrak{M}_{\mathcal{E}}(D_n, n)|.$$

Используя (6) и (8), можно легко показать, что

$$\frac{|Q^n|}{|P_2^n|} \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad n \rightarrow \infty.$$

Следствие.

1.

$$D_{\mathcal{E}}(n) \geq \tau_{\mathcal{E}}(n - \log_2 \log_2 n + o(1)).$$

2.

$$(9) \quad D_{\mathcal{E}}(n) \geq \lceil \tau_{\mathcal{E}}(n - \log_2 \log_2 n + O(1)) \rceil,$$

если все элементы базиса $\sum$ имеют в качестве глубины целое число.

§ 2. Формулировки и доказательства основных результатов

Рассмотрим некоторые двуместные базисы $\sum$ первого типа, для которых $\tau_{\mathcal{E}} = 1$, и докажем для каждого из них соотношение (2) с некоторой константой $C''_{\sum}$.

Положим

$$E_{\lambda}^{\times} = (x \cdot y, \lambda), \quad E_{\lambda}^{\vee} = (x \vee y, \lambda), \quad E_{\lambda}^{+} = (x + y, \lambda), \quad E_{\lambda}^{-} = (\bar{x}, \lambda)$$

и $E_{\lambda}^1 = (1, \lambda)$, где λ — произвольное целое число.

Теорема 1. Для базиса $\sum_0 = \{E_1^{\times}, E_1^{\vee}, E_1^{-}\}$ $C''_{\sum_0} = 0$. $\square$

Доказательство. Нижняя оценка, соответствующая соотношению (2) с $C''_{\sum} = 0$, для базиса $\sum_0$ следует непосредственно из (9).

Для получения верхней оценки используем специальное представление ф.а.л., построенное на основе конструкций О. Б. Лупанова из [6, 7] (ср. [1]).

Пусть k и t — некоторые натуральные числа, причем k является степенью 2, и пусть $d = k \cdot t$. Для $\mu = 1, 2, \dots, k$ через $\tilde{e}_{\mu}$ обозначим набор $(\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{\mu}, 1, 0, \dots, 0) \in B^k$, а через $(e_{\mu})^t$ — набор $(e_{\mu}, \tilde{e}_{\mu}, \dots, \tilde{e}_{\mu}) \in$

B^d . Для произвольного набора $\tilde{\beta} \in B^d$ t -сферой с центром $\tilde{\beta}$ будем называть множество наборов $\{\tilde{\beta} + (\tilde{e}_{\mu})^t\}_{\mu=1}^k$; t -сферу с центром $\tilde{\beta}$ будем называть хорошей, если для любого $\mu = 1, 2, \dots, k$ найдется такое целое v , $1 \leq v \leq d$, для которого $v = \mu \pmod{k}$ и $\beta_v = 0$, и плохой в противном случае.

Пусть единичные сферы с центрами $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_{2^d/k}$ образуют разбиение единичного куба B^k (см. § 1). Легко видеть, что всевозможные t -сферы A_i , $i = 1, 2, \dots, 2^d/k$, с центрами $\tilde{\beta}_i$, где β_i совпадает с одним

из наборов вида $(\tilde{\alpha}_v, \tilde{\gamma})$, $v = 1, 2, \dots, 2^k/k$, $\tilde{\gamma} \in B^{d-k}$, не пересекаются и образуют разбиение единичного куба B^d , причем отношение ε числа хороших t -сфер A_i к числу всех таких сфер удовлетворяет неравенству

$$(10) \quad \varepsilon \geq \left(1 - \frac{1}{2^{t-1}}\right).$$

Для произвольного набора $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_d) \in B^d$ и произвольной ф.а.л. $\psi(\tilde{u})$, где $\tilde{u} = (u_1, u_2, \dots, u_d)$, $u_i \in X$ при всех $i = 1, 2, \dots, d$, определим наборы

$$\tilde{R}(\tilde{\beta}) = (R_1(\tilde{\beta}), R_2(\tilde{\beta}), \dots, R_d(\tilde{\beta})),$$

$$\tilde{G}(\tilde{\beta}) = (G_1(\tilde{\beta}), G_2(\tilde{\beta}), \dots, G_d(\tilde{\beta})),$$

$$\tilde{H}(\tilde{\beta}, \psi) = (H_1(\tilde{\beta}, \psi), H_2(\tilde{\beta}, \psi), \dots, H_d(\tilde{\beta}, \psi))$$

из множества B^d следующим образом: для $r = 1, 2, \dots, d$ и $r' = r \pmod k$, $1 \leq r' \leq k$,

$$R_r(\tilde{\beta}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \beta_{r'} = \beta_{r'+k} = \dots = \beta_{r-k} = 1 \text{ и } \beta_r = 0 \\ 0 & \text{в остальных случаях;} \end{cases}$$

$$G_r(\tilde{\beta}) = \begin{cases} \beta_r, & \text{если } R_r(\tilde{\beta}) = 1 \\ 0 & \text{в остальных случаях;} \end{cases}$$

$$H_r(\tilde{\beta}, \psi) = \psi(\tilde{\beta} + (\tilde{l}_r)^t).$$

Пусть $\chi_{\tilde{\beta}}(\tilde{u})$ — характеристическая ф.а.л. t -сферы A с центром $\beta \in B^d$. Из определения t -сферы и введенных обозначений следует, что для любой ф.а.л. $\psi(\tilde{u})$

$$(11) \quad \chi_{\tilde{\beta}}(\tilde{u}) \cdot \psi(\tilde{u}) = \chi_{\tilde{\beta}}(\tilde{u}) \cdot I_{\tilde{R}(\tilde{\beta}) \cdot \tilde{H}(\tilde{\beta}, \psi), \tilde{G}(\tilde{\beta})}(\tilde{u}).$$

Заметим, что для хорошей t -сферы A с центром $\tilde{\beta}$ $\tilde{G}(\tilde{\beta}) = \tilde{0}$ и что для произвольной t -сферы A с центром $\tilde{\beta}$ справедливо

$$(12) \quad \|\tilde{R}(\tilde{\beta}) \cdot \tilde{H}(\tilde{\beta}, \psi)\| = |N_{\psi} \cap A|.$$

Пусть $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — произвольная ф.а.л. и a, b, c, d, k, t, s, p — натуральные числа, удовлетворяющие условиям:

$$(13) \quad k - \text{ степень } 2, \quad a + b + c + d = n, \quad d = k \cdot t, \quad s \leq 2^c, \quad p = \left\lfloor \frac{2^c}{s} \right\rfloor.$$

Пусть $A_1, A_2, \dots, A_{2^{d/k}}$ — t -сферы с центрами $\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_{2^{d/k}}$ соответственно, образующие разбиение единичного куба B^d и построенные описанным выше способом.

Введем обозначения:

$$1. \tilde{x} = (x_1, x_2, \dots, x_a), \quad \tilde{y} = (x_{a+1}, x_{a+2}, \dots, x_{a+b}), \quad \tilde{z} = (x_{a+b+1}, \dots, x_{a+b+c}), \quad \tilde{u} = (x_{a+b+c+1}, \dots, x_n);$$

$$2. \text{ для всех } \tilde{\sigma} \in B^a, \tilde{\varrho} \in B^b, i = 1, 2, \dots, 2^d/k$$

$$f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}}(\tilde{z}, \tilde{u}) = f(\tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, \tilde{z}, \tilde{u}) \cdot \chi_{\tilde{\beta}_i}(\tilde{u}).$$

Ф.а.л. $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}}$ зададим таблицей, строкам которой соответствуют всевозможные наборы из B^c , столбцам — всевозможные наборы из A_i , а на пересечении строки, соответствующей набору $\tilde{\pi} \in B^c$ и столбца, соответствующего набору $\tilde{\gamma} \in A_i$ стоит значение $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}}(\tilde{\pi}, \tilde{\gamma})$. Строки таблицы разрежем, как обычно, на полосы, содержащие по s строк каждая, за исключением, возможно, последней полосы, которая содержит $s' \leq s$ строк. Для $l = 1, 2, \dots, p$ определим ф.а.л. $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l}(\tilde{z}, \tilde{u})$, совпадающую с ф.а.л. $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}}$ на l -й полосе и равную 0 вне ее. Столбцы значений ф.а.л. $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l}$ $l = 1, 2, \dots, p$ разобьем на группы одинаковых столбцов, содержащих не более g_i , где $q_i \leq k$ — некоторый параметр, таких столбцов. Легко видеть, что число таких групп будет не более чем

$$(14) \quad N_i = \left\lfloor \frac{k}{q_i} \right\rfloor + 2^s.$$

Для определенности будем считать, что число групп в точности равно N_i , так как этого всегда можно добиться дополнительным подразбиением групп.

Для всех $j = 1, 2, \dots, N_i$ через $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}(\tilde{z}, \tilde{u})$ обозначим ф.а.л., совпадающую с $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l}$ на j -й группе столбцов и равную 0 вне ее. Очевидно, что

$$(15) \quad f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}(\tilde{z}, \tilde{u}) = f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}^{(1)}(\tilde{z}) \cdot f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}^{(2)}(\tilde{u}),$$

где $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}^{(1)}$ — ф.а.л. от переменных $\tilde{z}$, столбец значений которой есть любой из столбцов j -й группы, а $f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}^{(2)}$ — характеристическая ф.а.л. множества столбцов j -й группы. Пусть

$$\chi_{\tilde{\beta}_i}(\tilde{u}) = \chi_i(\tilde{u}), \quad \tilde{R}(\tilde{\beta}_i) = \tilde{R}_i,$$

$$\tilde{H}(\tilde{\beta}_i, f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}) = \tilde{H}_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}, \quad \tilde{G}(\tilde{\beta}_i) = \tilde{G}_i.$$

Из (11) следует, что

$$(16) \quad f_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j}^{(2)}(\tilde{u}) = \chi_i(\tilde{u}) \cdot I_{\tilde{F}_i \cdot \tilde{H}_i, \tilde{\sigma}, \tilde{\varrho}, l, j, \tilde{\beta}_i}(\tilde{u}).$$

Пусть b', b'' — целочисленные параметры, удовлетворяющие соотношению $b' + b'' = b$ и пусть $\tilde{y}' = (x_{a+1}, \dots, x_{a+b'})$, $\tilde{y}'' = (x_{a+b'+1}, \dots, x_{a+b})$, $\tilde{\varrho}' \in B^{b'}$, $\tilde{\varrho}'' \in B^{b''}$. В силу (15) для ф.а.л. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ будут справедливы соотношения:

$$\begin{aligned}
& f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\
& = \bigvee_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}' \neq \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}'', l, j} K_{\tilde{\sigma}}(\tilde{x}) \cdot K_{(\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}'')}(\tilde{y}) \cdot f_{i, \tilde{\sigma}, (\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}''), l, j}^{(1)}(\tilde{z}) \cdot f_{i, \tilde{\sigma}, (\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}''), l, j}^{(2)}(\tilde{u}) \vee f^0 = \\
& = \bigvee_{i, \tilde{\sigma}, l, j} K_{\tilde{\sigma}}(\tilde{x}) \cdot \left(\bigvee_{\tilde{\sigma}' \neq \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}''} K_{(\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}'')}(\tilde{y}) \cdot f_{i, \tilde{\sigma}, (\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}''), l, j}^{(1)}(\tilde{z}) \right) \times \\
& \quad \times \left(\bigvee_{\tilde{\sigma}' \neq \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}''} K_{(\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}'')}(\tilde{y}) \cdot f_{i, \tilde{\sigma}, (\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}''), l, j}^{(2)}(\tilde{u}) \right) \vee f^0
\end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned}
(17) \quad & f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\
& = \bigvee_{i, \tilde{\sigma}, l, j} K_{\tilde{\sigma}}(\tilde{x}) \cdot g_{i, \tilde{\sigma}, l, j}(\tilde{y}, \tilde{z}) \cdot \&_{\tilde{\sigma}' \neq \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}''} \left(I_{(\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}'')}(\tilde{y}) \vee f_{i, \tilde{\sigma}, (\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}''), l, j}^{(2)}(\tilde{u}) \right) \vee f^0
\end{aligned}$$

где

$$g_{i, \tilde{\sigma}, l, j}(\tilde{y}, \tilde{z}) = \bigvee_{\tilde{\sigma}' \neq \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}''} K_{(\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}'')}(\tilde{y}) \cdot f_{i, \tilde{\sigma}, (\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}''), l, j}^{(1)}(\tilde{z}); \quad f^0 = f(\tilde{x}, \tilde{\sigma}, \tilde{y}'', \tilde{z}, \tilde{u}).$$

Из (16) и (17) следует, что

$$\begin{aligned}
(18) \quad & f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\
& = \bigvee_{i, \tilde{\sigma}, l, j} \underbrace{K_{\tilde{\sigma}}(\tilde{x}) \chi_i(\tilde{u}) g_{i, \tilde{\sigma}, l, j}(\tilde{y}, \tilde{z})}_{F_{i, \tilde{\sigma}, l, j}^{(1)}} \&_{\tilde{\sigma}' \neq \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}''} \underbrace{\left(I_{(\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}'')}(\tilde{y}) \vee I_{\tilde{R}_i \cdot \tilde{H}_i, \tilde{\sigma}, (\tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}''), l, j}, \tilde{G}_i(\tilde{u}) \right)}_{F_{i, \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}', l, j}^{(2)}} \vee f^0.
\end{aligned}$$

Выберем значения параметров следующим образом:

$$b = [2 \log_2 n], \quad b' = [\log_2 \log_2 n], \quad c = [2 \log_2 \log_2 n]$$

$$k = 2^{[\log_2 \log_2 n] - 1}, \quad t = [\log_2 n], \quad s = [\log_2 n - 7 \log_2 \log_2 n],$$

$$q_i = \begin{cases} q, & \text{если } A_i \text{ — хорошая } t\text{-сфера} \\ q/2, & \text{если } A_i \text{ — плохая } t\text{-сфера,} \end{cases}$$

где

$$(19) \quad 2b + q = 2^m,$$

$$(20) \quad (\log_2 n)^5 \leq q \leq 3(\log_2 n)^5.$$

Параметры a, d, p определяются из (13), а параметры k, s, c — удовлетворяют (13) при достаточно больших n .

Покажем, что можно построить такую ф. F над базисом $\sum_0$, которая реализует ф.а.л. f в соответствии с (18) и для которой

$$D_{\Sigma_0}(F) \leq]n - \log_2 \log_2 n + \delta_n''[,$$

где

$$\delta_n'' \leq \frac{2 \log_2 \log_2 n}{\log_2 n} + O\left(\frac{1}{\log_2 n}\right).$$

Используя однородную полную μ -ярусную ф., построенную из элементов $E_1^{\&}$ (соответственно $E_1^{\vee}$), для реализации ф.а.л. $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_M$ (соответственно $x_1 \vee x_2 \vee \dots \vee x_M$), где $M \leq 2^\mu$, легко показать, что

$$(21) \quad D_{x_0}(K_{\sigma}(\tilde{x})) \leq \lfloor \log_2 n \rfloor + 1 \leq \log_2 n + 2$$

$$(22) \quad D_{x_0}(\chi_i(\tilde{u})) \leq \lfloor \log_2 d \rfloor + 1 + \lfloor \log_2 k \rfloor \leq 2 \log_2 n$$

$$(23) \quad D_{x_0}(g_{i, \tilde{\sigma}, l, j}(\tilde{y}, \tilde{z})) \leq b + c + 1 + \lfloor \log_2(b + c) \rfloor \leq 2 \log_2 n + 3 \log_2 \log_2 n + 3 + o(1).$$

Из (18), (21)–(23) следует, что можно построить ф. $F_{i, \sigma, l, j}^{(1)}$ таким образом, что

$$D_{x_0}(F_{i, \sigma, l, j}^{(1)}) \leq 2 + \max\{D_{x_0}(K_{\sigma}(\tilde{x})), D_{x_0}(\chi_i(\tilde{u})), D_{x_0}(g_{i, \tilde{\sigma}, l, j})\},$$

то есть

$$(24) \quad D_{x_0}(F_{i, \sigma, l, j}^{(1)}) \leq 2 \log_2 n + 3 \log_2 \log_2 n + 5 + o(1).$$

Из (11), (12), (16), (19), (18) следует, что можно построить формулы $F_{i, \sigma, \tilde{\sigma}, \tilde{\sigma}'', l, j}^{(2)}$ и $F_{i, \sigma, \tilde{\sigma}', l, j}^{(2)}$ таким образом, что

$$(25) \quad \begin{aligned} D_{x_0}(F_{i, \sigma, \tilde{\sigma}', \tilde{\sigma}'', l, j}^{(2)}) &\leq m, \\ D_{x_0}(F_{i, \sigma, \tilde{\sigma}', l, j}^{(2)}) &\leq b'' + m. \end{aligned}$$

Для того, чтобы получить ф. $F_{i, \sigma, l, j}^{(3)}$ построим b' -ярусную однородную полную формулу из элементов $E_1^{\&}$, отождествим каждый ее вход с выходом ф. $F_{i, \sigma, l, j}^{(1)}$, $F_{i, \sigma, \tilde{\sigma}', l, j}^{(2)}$ для всех $\tilde{\sigma} \neq \tilde{\sigma}'$ и склеим одноименные входы всех таких ф. В силу (24) и (25)

$$(26) \quad D_{x_0}(F_{i, \sigma, l, j}^{(3)}) \leq b' + b'' + m = b + m.$$

Так как $(n - b') \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$, то в силу (1) можно построить ф. F^0 , которая реализует ф.а.л. f^0 и для которой при достаточно больших n

$$(27) \quad D_{x_0}(F^0) \leq n - b' - \log_2 \log_2 n + 3 \leq n - 2 \log_2 \log_2 n + 4.$$

Обозначим через I множество различных индексных наборов $(i, \tilde{\sigma}, l, j)$. Очевидно, что $2^d/k$

$$|I| \leq 2^d \cdot p \cdot \sum_{i=1} N_i$$

и поэтому в силу (10), (13), (14), (19) и (20)

$$\begin{aligned} |I| &\leq 2^a \cdot p \cdot \sum_{i=1}^{2^{d/k}} \left(\frac{k}{q_i} + 2^s + 1 \right) \leq 2^a \cdot p \cdot \frac{2^d}{q} \left(1 + (1 - \epsilon) + \frac{(2^s + 1)q}{k} \right) \leq \\ &\leq \frac{2^{n-b}}{q \cdot s} (1 + \delta) \end{aligned}$$

где

$$\delta = O\left(\frac{1}{\log_2 n}\right).$$

Пусть $\lambda = \lfloor \log_2 \log_2 n \rfloor - 5$. Ф. F , реализующую ф.а.л. f в соответствии с (18), построим следующим образом. Множество I разобьем на непересекающиеся подмножества $I_1, I_2, \dots, I_{2^\lambda - 1}$, каждое из которых содержит не более чем $|I|/2^\lambda - 1$ элементов. Для $\mu = 1, 2, \dots, 2^\lambda - 1$ через F_μ обозначим ф., которая получается склеиванием одноименных входов всех ф. $F_{i, \sigma, l, j}^{(3)}$, соответствующих наборам $(i, \tilde{\sigma}, l, j) \in I_\mu$, и отождествлением выхода каждой такой ф. с одним из входов однородной полной μ -ярусной ф., где $\mu = \left\lfloor \log_2 \left(\frac{|I|}{2^\lambda - 1} \right) \right\rfloor$, построенной из элементов $E_1^\vee$. В силу (26)

$$D_{\Sigma_0}(F_\mu) \leq \left\lfloor \log_2 \left(\frac{|I|}{2^\lambda - 1} \right) \right\rfloor + b + m \leq \lfloor n - \lambda - \log_2 q - \log_2 s + \delta' \rfloor + m \quad (28)$$

где

$$\delta' \leq \delta + \log_2 \left(1 + \frac{1}{2^\lambda - 1} \right) = O\left(\frac{1}{\log_2 n}\right).$$

Ф. F получается склеиванием одноименных входов ф. $F^0, F_1, F_2, \dots, F_{2^\lambda - 1}$ и отождествлением выхода каждой из этих ф. с одним из входов λ -ярусной однородной ф., построенной из элементов $E_1^\vee$. В силу (27) и (28) для F будет справедливо

$$D_{\Sigma_0}(F) \leq \lfloor n - \lambda - \log_2 q - \log_2 s + \delta' \rfloor + m + \lambda \leq \lfloor n - \log_2 \log_2 n + \delta'' \rfloor$$

где

$$\begin{aligned} \delta'' &\leq \delta' + \log_2 \left(1 + \frac{2b}{q - 4b} \right) + (\log_2 \log_2 n - \log_2 s) \leq \\ &\leq \frac{2 \log_2 \log_2 n}{\log_2 n} + O\left(\frac{1}{\log_2 n}\right). \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Теорема 2. Для базиса $\Sigma_1 = \{E_1^\vee, E_1^\neg\}$ $C_{\Sigma_1} = 2$. $\square$

Доказательство. Требуемая верхняя оценка функции Шеннона получается так же, как и в теореме 1, на основе представления (18). Э. к. $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_M$ реализуется при этом как $(\bar{x}_1 \vee \bar{x} \vee \dots \vee \bar{x}_M)$.

Для получения необходимой в данном случае нижней оценки рассмотрим множество $Q^n \leq P_n^2$, состоящее из тех ф.а.л. f , у которых ранг допустимых э. к. не меньше чем $n - \lceil \log_2 n \rceil - 1$. Как известно (см., например, [2] стр. 133),

$$\frac{|Q^n|}{|P_n^2|} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Для а.ф. F над базисом $\sum_1$ через $V_{\text{вх}}(F, t)$, где t — произвольное целое число, будем обозначать множество входов $w \in V_{\text{вн}}(F)$, обладающих тем свойством, что среди вершин $w_i \in V_{\text{вн}}(F)$, $i = 1, 2, \dots, l$, для которых $(w_{i-1} \rightarrow w_i) \in U(F)$ при всех $i = 2, 3, \dots, l$ и $(w \rightarrow w_1) \in U(F)$, по крайней мере t вершин помечено символом E_1^- .

Лемма 4. Для любой а.ф. F над $\sum_1$ и любого $t = 0, 1, 2, \dots$,

$$(29) \quad |V_{\text{вх}}(F, t)| \leq 2^{D(F)-t}. \quad \square$$

Доказательство проводится индукцией по t с использованием (3).

Пусть $\mathcal{M}'_{\sum_1}(D, n)$ — множество всех тех ф. $F' \in \mathcal{M}_{\sum_1}(D, n)$, для которых соответствующая а.ф. $F'' \in \mathcal{M}_{\sum_1}(D)$ обладает следующими свойствами:

1. $V_{\text{вх}}(F'') = V_{\text{вх}}(F'', 1)$;

2. для любой вершины w из множества $V_{\text{вн}}^{(1)}(F'')$, состоящего из тех внутренних вершин а.ф. F'' , помеченных символом E_1^- , «ниже» которых уже нет вершин, помеченных E_1^- , справедливо неравенство

$$|V_{\text{вх}}(F''_w)| \geq \frac{n}{2},$$

где F''_w — подформула а.ф. F'' , «вырастающая вверх» из w .

Легко видеть, что любая ф.а.л. $f \in Q^n$ реализуется некоторой формулой из $\mathcal{M}'_{\sum_1}(D_{\sum_1}(f), n)$ при $n \geq b$.

По построению множества $\mathcal{M}'_{\sum_1}(D, n)$ для любой а.ф. F'' , соответствующей некоторой ф. F' из этого множества,

$$(30) \quad |V_{\text{вн}}^{(1)}(F'')| \leq \frac{2 |V_{\text{вх}}(F'')|}{n}.$$

Учитывая (4), (29)–(30) и то, что число способов приписывания переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ тем входным вершинам w а.ф. $F'' \in \mathcal{M}_{\sum_1}(D)$, которые принадлежат множеству $V_{\text{вх}}(F'') \setminus V_{\text{вх}}(F'', 2)$ не больше чем $(2^n)^{|V_{\text{вн}}^{(1)}(F'')|}$ легко получить оценку

$$(31) \quad |\mathcal{M}'(D, n)| \leq (C_2)^{2^D} \cdot n^{2^{D-2}}.$$

На основе (31) с помощью обычных мощностных рассуждений (см. доказательство леммы 3) можно доказать, что

$$D_{\Sigma_1}(n) \geq \lfloor n - \log_2 \log_2 n + o(1) \rfloor + 2.$$

Теорема доказана.

Замечание. Теорема 2 дает пример получения нижней оценки для функции Шеннона $D_{\Sigma}(n)$ с помощью мощностных рассуждений, учитывающих специфику тех ф.а.л., которые реализуются элементами базиса.

Теорема 3. Для базисов $\Sigma_2 = \{E_1^+, E_1^{\&}, E_1^1\}$ и $\Sigma_3 = \{E_1^+, E_2^{\&}, E_1^1\}$

$$C_{\Sigma_2}'' = 0, \quad C_{\Sigma_3}'' = 2. \quad \square$$

При доказательстве теоремы 3 соответствующая верхняя оценка получается на основе представлений аналогичных представлению (18), в котором операция дизъюнкции заменена операцией сложения по модулю 2 (для базиса Σ_3 полученное таким образом представление должно несколько видоизменено, для того, чтобы избавиться от «длинных» конъюнкций).

Требуемая нижняя оценка для базиса Σ_2 следует из (9), а для базиса Σ_3 получается так же, как при доказательстве теоремы 2, если в качестве множества Q^n взять множество тех ф.а.л. $f \in P_2^n$, в полиноме Жегалкина которых отсутствуют слагаемые (каждое такое слагаемое является некоторой монотонной э. к.) ранга меньше чем $\frac{n}{3}$.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Гашков С. Б.: О глубине булевых функций. Проблемы кибернетики, вып. 34, М.: Наука, 1978, с. 265 – 268.
- [2] Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. т. 1. М.: Наука, 1974.
- [3] Ложкин С. А.: Асимптотическое поведение функций Шеннона для задержек схем из функциональных элементов. Матем. заметки, 1976, т. 19, № 6, с. 939 – 951.
- [4] Ложкин С. А.: О критической задержке для схем из функциональных элементов с задержками. Проблемы кибернетики, вып. 37, М.: Наука, 1980, с. 119 – 138.
- [5] Ложкин С. А.: О поведении функции Шеннона для глубины булевских функций в некоторых базисах. У Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики. Тезисы докладов. Новосибирск, 1980, с. 69 – 70.
- [6] Лупанов О. Б.: О сложности реализации функций алгебры логики формулами. Проблемы кибернетики, вып. 3, М.: Физматгиз, 1960, с. 61 – 80.
- [7] Лупанов О. Б.: О сложности универсальной параллельно-последовательной сети глубины 3. Труды Матем. ин-та им. В. А. Стеклова, 1973, т. 133, с. 127 – 131.
- [8] Лупанов О. Б.: О схемах из функциональных элементов с задержками. Проблемы кибернетики, вып. 23, М.: Наука, 1970, с. 43 – 81.
- [9] Лупанов О. Б.: Об одном классе схем из функциональных элементов. Проблемы кибернетики, вып. 7, М.: Физматгиз, 1962, с. 61 – 114.
- [10] Храпченко В. М.: Различие и сходство между задержкой и глубиной. Проблемы кибернетики, вып. 35, М.: Наука, 1979, с. 141 – 168.
- [11] Mc Coll W. F., Paterson M. S.: The depth of all Boolean functions. SIAM Journ. on Computing, 1977, v. 6, 2, p. 373 – 380.
- [12] Spira P. M.: On the time necessary to compute switching functions. IEEE Trans. C-20, 1971, № 1, p. 104 – 105.

